



Passeport

Nom	3 Vert
Groupe Variétal	Plantain (génome AAB)
Type de plantain	French-Corne (Bâtard)
Origine / Provenance	Côte d'Ivoire
Sélection	Cirad
Site d'évaluation	CARBAP Cameroun. Cirad Site de Neufchâteau



Durée du cycle/ Vigueur (moyennes cycle 1)

Intervalle plantation-Récolte (jours)	393-537
Intervalle plantation-Floraison (jours)	321-443
Intervalle Floraison-Coupe (jours)	72-103
Hauteur pseudo-tronc à la récolte (cm)	329-393
Circonférence du pseudo-tronc à la floraison à 1 mètre du sol (cm)	53-64

Régime/Pomologie (moyennes cycle 1)

Poids régime (Kg)	13-19
Nombre de mains	6-8
Nombre de doigts	58-71
Longueur doigt médian (mm)	20-22,5
Poids doigt médian (g)	152-297

Sensibilité/résistance aux bio-agresseurs

Cercosporiose noire	Tolérance partielle. Gestion correcte avec un effeuillage hebdomadaire
Cercosporiose jaune	Tolérance partielle
Charançon noir	Très sensible (à gérer avec des vitroplants, jachère et piégeage)
Nématodes	Sensible (à gérer avec des vitroplants sur sol assaini après jachère)



Passeport	
Nom	Dominico-Hartón Enano
Groupe Variétal	Plantain (génome AAB)
Type de plantain	Faux-Corne Nain
Origine / Provenance	Honduras
Sélection	Cirad Antilles-Guyane
Site d'évaluation	Cirad Neufchâteau



Vigueur/Durée du cycle (moyenne cycle 1)	
Intervalle plantation-Récolte (jours)	328-453
Intervalle plantation-floraison (jours)	264-389
Intervalle floraison-récolte (jours)	64-74
Hauteur du pseudo-tronc au cycle 1 (cm)	198-230
Circonférence du pseudo-tronc au cycle 1 (cm)	42-46

Régime/Qualité pomologique (moyennes cycle 1)	
Poids régime (Kg)	7-12
Nombre de mains	7
Nombre de doigts	27-38
Longueur doigt médian (cm)	19-23
Poids doigt médian (g)	195-276

Sensibilité/résistance aux bio-agresseurs

Cercosporiose noire	Tolérance partielle (à gérer avec un effeuillage hebdomadaire) Partial tolerance (to be managed with weekly leaf removal)
Cercosporiose jaune	Tolérance partielle
Charançon noir	Sensible (à gérer avec des vitroplants sur sol sain, une bonne jachère et du piégeage). Sensitive (to be managed with vitroplants on healthy soil, good fallowing and trapping).
Nématodes	Sensible (à gérer avec des vitroplants sur un sol assaini par une jachère)



Passeport	
Nom	RED EBANGA
Groupe Variétal	Plantain (génome AAB)
Type de plantain	Faux-Corne
Origine / Provenance	Cameroun
Sélection	Cirad
Site d'évaluation	CARBAP Cameroun / Cirad Neufchâteau (CRB PT)



Durée du cycle/ Vigueur (moyennes cycle 1)	
Intervalle plantation-Récolte du cycle (jours)	318-434
Intervalle Plantation-Floraison (jours)	265-374
Intervalle Plantation-Coupe (jours)	53-94
Hauteur pseudo-tronc à la récolte (cm)	258-296
Circonférence du pseudo-tronc à la floraison à 1 mètre du sol (cm)	42-47

Régime/Pomologie (moyennes cycle 1)	
Poids régime (Kg)	6-10
Nombre de mains	6-7
Nombre de doigts	24-31
Longueur doigt médian (cm)	22
Poids doigt médian (g)	292

Sensibilité/résistance aux bio-agresseurs	
Cercosporiose noire	Tolérance partielle (à gérer avec un effeuillage hebdomadaire)
Cercosporiose jaune	Tolérance partielle
Charançon noir	Très sensible (à gérer avec des vitroplants, une bonne jachère et du piégeage)
Nématodes	Sensible (à gérer avec des vitroplants sur sol assaini après une bonne jachère)



Passeport

Nom	Mbouroukou N°1
Groupe Variétal	Plantain (génome AAB)
Type de plantain	Faux-Corne
Origine / Provenance	Cameroun
Sélection	Cirad
Site d'évaluation	Cirad Neufchâteau



Durée du cycle /Vigueur (moyenne cycle 1)

Intervalle plantation-Récolte (jours)	305-386
Intervalle plantation-Floraison (jours)	251-323
Intervalle floraison-récolte (jours)	54-63
Hauteur du pseudo-tronc au cycle 1 (cm)	258-262
Circonférence du pseudo-tronc au cycle 1 (cm)	44-48

Régime/Qualité pomologique (cycle 1)

Poids régime (Kg)	9-14
Nombre de mains	6-7
Nombre de doigts	24-31
Longueur doigt médian (cm)	26-28
Poids doigt médian (g)	334-424

Sensibilité/résistance aux bio-agresseurs

Cercosporiose noire	Tolérance partielle (Gestion correcte avec un effeuillage hebdomadaire)
Cercosporiose jaune	Tolérance partielle
Charançon noir	Très sensible (à gérer avec des vitroplants, jachère et piégeage)
Nématodes	Sensible (à gérer avec des vitroplants sur sol assaini après jachère)